



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Nieuwsbericht: Vaccinatie alternatieven en update Richtlijn

Traject: vaccinatie bewoners van instellingen met eigen medische dienst en instellingen onder verantwoordelijkheid van de HA
21mei 2021

Update uitvoeringsrichtlijn over houdbaarheid Pfizer

Voor de instellingen die geen gebruik maken van het mobiele prikteam, maar zelf flacons bestellen is het van belang de update over de houdbaarheid van Pfizer te lezen in de [Uitvoeringsrichtlijn](#).

Alternatieven voor mobiele mensen

U heeft gemerkt, dat er achterstanden zijn bij Thuisvaccinatie voor het inplannen van de veegrondes voor instellingen. Indien u mensen heeft aangemeld bij Thuisvaccinatie, dan staat u op de planning voor ná week 20. Daarom bieden we u graag twee andere opties:

1. Alle mobiele mensen (cliënten en medewerkers) die een eerste prik hebben gehad kunnen voor een tweede prik (zowel Moderna als Pfizer) naar de GGD. Indien u hiervan gebruik wil maken stuurt u dan een mail met het aantal personen en het merk vaccin (Pfizer of Moderna) naar covid-19vaccinatiebewoners@rivm.nl
2. Alle mobiele cliënten die nog een eerste en tweede prik moeten kunnen naar de GGD. Daarvoor kunt u bijgesloten uitnodiging gebruiken. Dit is een standaard uitnodigingsbrief. Instellingen kunnen deze aanpassen, zodat die in woordkeuze, toonzetting en informatie aansluit bij de aanspreekvorm, werkwijze vanuit de betreffende organisatie. Deze uitnodiging heel graag alleen voor de genoemde doelgroep gebruiken (bewoners van instellingen met eigen medische dienst en instellingen onder verantwoordelijkheid van de HA).

Mocht u voor één van deze twee opties kiezen, wilt u dit dan doorgeven aan covid-19vaccinatiebewoners@RIVM.nl en aan rivmcovid@thuisvaccinatie.nl ? Het staat u ook vrij geen gebruik te maken van deze opties. U hoort dan zo spoedig mogelijk wanneer u op de planning staat voor Thuisvaccinatie.

Het interval tussen de eerste en tweede prik

Het interval dat vanaf medio januari 2021 gehanteerd wordt tussen de twee doses is 6 weken, dus tussen 35 en 42 dagen. Dat is langer dan het standaard interval van 21 dagen dat in de bijsluiters vermeld staat en tot medio januari gehanteerd werd. Als de tweede vaccinatie buiten het interval van 21-42 dagen valt – dus eerder of later is toegediend – hoeft de vaccinatieserie niet opnieuw te worden gestart. Er hoeft geen derde vaccinatie gegeven te worden. Na de eerste vaccinatie daalt de bescherming tegen het COVID-19 virus na een aantal weken. Daarom wordt geadviseerd na 5-6 weken de tweede vaccinatie te geven. Als de tweede vaccinatie na een interval van langer dan 5-6 weken plaatsvindt zal men dus een tijd na de eerste vaccinatie wat minder beschermd zijn. Maar na de tweede prik is men weer goed beschermd. De langdurige bescherming tegen COVID-19 zal hetzelfde zijn of mogelijk zelfs beter.