



Вакцинация во время беременности

Если вы беременны, вы можете сделать 2 прививки. Против гриппа и коклюша. Прививки защищают вас и вашего ребенка.



Коклюш



Коклюш может вызывать сильные приступы кашля. Они могут длиться месяцами.



Кашель у младенцев может привести к пневмонии или повреждению мозга.



Иногда ребенка помещают в больницу. Младенцы могут умереть от последствий коклюша.

Грипп



При гриппе младенцы могут очень сильно болеть и задыхаться.



Если ребенок заболевает пневмонией, его кладут в больницу.



Беременные женщины также могут сильно заболеть гриппом.

Как это работает?

После вакцинации у вас вырабатываются антитела. Они попадают к ребенку через плаценту. Это также защитит вашего ребенка в первые месяцы после рождения от коклюша и гриппа и их серьезных последствий.

На 1 прививку меньше

Для прививки от коклюша действует правило: если вы сделаете прививку, вашему ребенку понадобится на 1 прививку меньше.



Когда?

Прививки можно делать с 22-й недели и до конца беременности. Прививку от гриппа можно сделать только в период с 15 октября по 1 марта.



Какие могут быть побочные эффекты?

Прививки безопасны для вас и вашего ребенка. Но иногда бывают побочные эффекты.



Боль в месте укола



Вялость



Головная боль

Где делают прививку?

Запишитесь на прием в консультационный центр по месту жительства. Посетите сайт www.rijksvaccinatieprogramma.nl/afspraak-maken-22wekenprik-grieprik



Есть вопросы?

Посетите сайт www.rivm.nl/zwanger-en-vaccineren или задайте свой вопрос в консультационном центре или вашей акушерке.

