



Vragenlijst SOAP 2025

Demografie

GGD locatie: -----

Persoonsnummer: -----

Consultnummer: -----

Datum consult: dd/mm/yyyy

Postcode cliënt (4 cijfers): ----

- Geen vast verblijfadres
- Wonend in het buitenland
- Onbekend

Geboortjaar: ----
 Onbekend

Geslacht geregistreerd bij geboorte:

- Man
- Vrouw

Genderidentiteit (geslacht volgens gevoel)

- Man
- Vrouw
- Anders (non-binair, genderfluïde, agender, etc.)

Is er sprake van gender-bevestigende chirurgie van de genitalia?

- Nee
- Ja, namelijk:
 - Vaginoplastiek / neo-vagina chirurgie
 - Phalloplastiek / neo-penis chirurgie
 - Hysterectomie / baarmoederverwijdering

Opleidingsniveau:

- Laag
- Middelbaar
- Hoog
- Anders, nl.....
- Onbekend

| Land/werelddeel van geboorte | index | moeder | vader |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nederland | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Marokko | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Turkije | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Indonesië | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Suriname | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Nederlandse Antillen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Noord/West/Midden Europa | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Zuid Europa | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Oost-Europa/MOE-landen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Zuid Afrika | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| West Afrika | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Oost Afrika | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Noord Afrika | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Midden Afrika | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Noord Amerika | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Midden Amerika | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Zuid Amerika | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Oceanië | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| West-Azië | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Azië | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Onbekend | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Hulpvraag

Hulpvraag

- Soa-consult
- Seksualiteit
- Seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld
- Anticonceptie
- Onbedoelde zwangerschap
- Genderidentiteit
- Soa (geen test)
- Anders, nl

Hulpvraag seksualiteit

- Vragen over (problemen met) lichaam
- Seksuele dysfuncties
- Seksuele oriëntatie
- Seksueel gedrag/techniek
- Anders

Consult

Type soa-consult

- Soa
- PrEP start consult
- PrEP follow-up consult

Gespreksvorm van het initiële consult

- Consult op locatie (CSG of outreach)
- Video/telefonisch consult
- Geen gesprek

Manier van testafname

- Op CSG/outreach locatie
- Thuisestpakket
- Op priklocatie (niet testlab)
- Testlab / man tot man

Indicatiestelling

Sekspartners in de afgelopen 6 maanden:

- Cis-mannen
- Cis-vrouwen
- Genderdiverse personen (bijv. trans, non-binair, genderfluïde, etc.)
 - met (neo-)penis
 - met (neo-)vagina

Geïnformeerd door partner:

- Nee
- Ja
- Onbekend

Indien geïnformeerd:

- **Voor welke soa?** Chlamydia LGV Hiv Hepatitis C Anders
 Gonorrhoe Syfilis Hepatitis B Trichomonas Onbekend/weet niet

▪ Geïnformeerd door een recent sekscontact?

- Nee, laatste sekscontact met deze persoon was meer dan 2 weken geleden
- Ja, laatste sekscontact met deze persoon was ≤ 2 weken geleden
- Verzender notificatie onbekend/anoniem

▪ Hoe is de cliënt geïnformeerd?

- Door de partner (index): persoonlijk, telefonisch, sms, whatsapp, e-mail, etc
- Door de partner (index) via een waarschuwingsstrook
- Via PW.nl met een code
- Via een zorgverlener van CSG

Soa klachten:

- Nee
- Ja
- Onbekend

Indien klachten: kunnen deze klachten wijzen op syfilis of hiv?

- Nee
- Ja
- Onbekend

Partner uit doelgroep:

- Nee
- Ja
- Onbekend

Indien ja: welke doelgroep?

- Partner geboren in soa endemisch gebied
- Ouders van partner geboren in soa endemisch gebied
- Geboorteland partner/ouders onbekend
- Indien vrouw: partner is MSM

Sekswork in de afgelopen 6 maanden:

- Nee
- Ja
- Onbekend

Slachtoffer van seksueel geweld/verkrachting? (Facultatief)

- Nee
- Ja
- Onbekend

Andere indicatie (Facultatief) _____**Deelname aan onderzoek (in te vullen in overleg met RIVM)** _____

Soa/hiv test- en risicogedrag

Heeft de cliënt in het afgelopen jaar een soa-test gedaan?

- Nee
- Ja
- Onbekend

Indien getest: chlamydia, gonorrhoe of syfilis gehad?

- Ja
- Nee
- Weet niet
- Onbekend

Heeft de cliënt een eerdere hiv-test gedaan?

- Nee
- Ja, positief
- Ja, negatief
- Ja, uitslag onbekend
- Onbekend

Indien eerder getest: hoe lang geleden?

- 0-3 maanden geleden
- 4-6 maanden geleden
- 7-12 maanden geleden
- Meer dan 12 maanden geleden
- Onbekend

Indien nieuwe hiv-diagnose: waar was de laatste hiv-test?

- GGD (incl. Testlab of outreach)
- Huisarts
- Ziekenhuis
- Andere zorgverlener in Nederland
- Zorgverlener in het buitenland
- Thuisafnametest die naar het lab is gestuurd
- Zelftest die direct de uitslag gaf
- Onbekend

Met hoeveel personen heeft de cliënt seksueel contact gehad in de laatste 6 maanden? _____ Onbekend

Seks en condoomgebruik in de laatste 6 maanden:

Receptieve anale seks

- Nee
- Ja, altijd met condoom
- Ja, niet altijd met condoom
- Ja, nooit met condoom
- Onbekend

Insertieve anale seks

- Nee
- Ja, altijd met condoom
- Ja, niet altijd met condoom
- Ja, nooit met condoom
- Onbekend

Vaginale seks

- Nee
- Ja, altijd met condoom
- Ja, niet altijd met condoom
- Ja, nooit met condoom
- Onbekend

Gepijpt (orale seks geven):

- Nee
- Ja, altijd met condoom
- Ja, niet altijd met condoom
- Ja, nooit met condoom
- Onbekend

Seks onder invloed van drugs of alcohol of erectiestimulerende middelen in de afgelopen 6 maanden? (Verplicht voor MSM en genderdiverse personen)

- Nee
- Ja
- Onbekend

Indien ja: welke drugs?

Uppers

- Cocaïne
- XTC/MDMA
- Speed
- Crystal Meth ("Tina")
- Mephedrone ("Miau miau")
- 3-MMC
- 4-MEC
- 4-FA

Downers

- Alcohol (aangeschoten/dronken)
- Wiet/Hasj
- GHB/GBL ("Gina")
- Ketamine
- Heroïne

Anders

- Poppers
- Erectiestimulerende middelen
- Anders, nl.....

Indien ja: heeft de cliënt drugs geslamt/geïnjecteerd?

- Nee
- Ja

Extra vragen voor MSM

Heeft de cliënt in de afgelopen 6 maanden seksueel contact gehad met meerdere mannen tegelijk of kort achter elkaar (groepsseks)?

- Nee
- Ja
- Onbekend

Heeft de cliënt in de afgelopen 3 maanden preventief antibiotica gebruikt voor of na seksueel contact om soa te voorkomen?

- Nee
- Ja, Doxycycline (DoxyPEP/ DoxyPrEP)
- Ja, een ander antibioticum
- Onbekend

Heeft de cliënt in de afgelopen 6 maanden MPX (apenpokkenvirus/Monkeypox) gehad? (Facultatief)

- Nee
- Ja
- Onbekend

Indien ja: maand en jaar MPX infectie

(datum eerste ziektedag of indien onbekend datum positieve testuitslag)

Jaar: _ _ _ _ Maand: _ _

Is de cliënt gevaccineerd tegen MPX (apenpokkenvirus/Monkeypox)? (Facultatief)

- Nee
- Ja

Indien ja: maand en jaar laatste MPX vaccinatie

Jaar: _ _ _ _ Maand: _ _

PrEP vragen regulier soa consult/via testlab

Heeft de cliënt PrEP gebruikt in het afgelopen jaar?

- Nee
- Ja, in de afgelopen 3 maanden
- Ja, 4-12 maanden geleden

Indien PrEP gebruikt:

▪ hoe heeft u PrEP gebruikt? (beide antwoorden mogelijk)

- Dagelijks
- Rondom seks

▪ wie heeft PrEP voorgeschreven/schrijft PrEP voor (meer dan 1 antwoord mogelijk)

- GGD-arts
- Huisarts
- Hiv behandelaar
- Andere arts/specialist
- Informeel/buitenland
- Anders

Indien PrEP 4-12 maanden geleden gebruikt: waarom gestopt? (Meerdere redenen mogelijk)

Medische redenen:

- Nierfunctiestoornis
- Medicatie interacties
- Hiv-diagnose

Persoonlijke redenen:

- Minder risicogedrag
- Ervaren bijwerkingen
- Logistieke redenen
- Financiële redenen
- Niet therapiegetrouw

Anders

- Anders, nl....
- Onbekend

Indien geen PrEP gebruikt: had de cliënt PrEP willen gebruiken?

- Ja
- Nee
- Weet cliënt niet/onbekend

Indien ja: waarom heeft de cliënt geen PrEP gebruikt? (meerdere keuzes mogelijk)

- Ik heb (nog) geen actie ondernomen
- Ik sta op de wachtlijst bij het CSG
- Ik kom niet in aanmerking voor PrEP-zorg bij het CSG
- Ik wil niet naar mijn huisarts
- Mijn huisarts biedt geen PrEP-zorg
- Ik vind PrEP-zorg en/of medicatie te duur
- Anders, nl.....

PrEP vragen start consult

Indien PrEP start consult: op basis van welke indicaties in de afgelopen 6 maanden?

(meerdere antwoorden mogelijk)

- Rectale soa of syfilis diagnose
- Anale seks zonder condoom met partner met onbekende hiv-status of detecteerbare viral load
- PEP-kuur
- Geen indicatie
- Andere redenen
 - Financiële redenen
 - Angst voor hiv
 - Cliënt wil/kan niet terecht bij de huisarts
 - Cliënt wil zich optimaal beschermen
 - Kwetsbaar (o.a. MSM <25 jaar, migrant, sekswerk, transgender, onverzekerd)
 - Anders, namelijk

Heeft de cliënt PrEP gebruikt in het afgelopen jaar? Indien PrEP gebruikt:

- Nee
- Ja, in de afgelopen 3 maanden
- Ja, 4-12 maanden geleden

▪ **hoe heeft de cliënt PrEP gebruikt?** (beide antwoorden mogelijk)

- Dagelijks
- Randon seks

▪ **wie heeft PrEP voorgeschreven/schrijft PrEP voor** (meer dan 1 antwoord mogelijk)

- GGD-arts
- Huisarts
- Hiv behandelaar
- Andere arts/specialist
- Informeel/buitenland
- Anders

Indien PrEP 4-12 maanden geleden gebruikt: waarom gestopt? (Meerdere redenen mogelijk)

Medische redenen:

- Nierfunctiestoornis
- Medicatie interacties
- Hiv-diagnose

Persoonlijke redenen:

- Minder risicogedrag
- Ervaren bijwerkingen
- Logistieke redenen
- Financiële redenen
- Niet therapiegetrouw

Anders

- Anders, nl....
- Onbekend

PrEP vragen follow-up consult

Heeft de cliënt PrEP gebruikt in het afgelopen jaar? Indien PrEP gebruikt: hoe heeft de cliënt PrEP gebruikt? (beide antwoorden mogelijk)

- Nee
- Ja, in de afgelopen 3 maanden
- Ja, 4-12 maanden geleden

- Dagelijks
- Randon seks

Gaat de cliënt de komende 3 maanden door met PrEP?

- Ja
- Ja, maar niet meer via CSG
- Ja, maar via een ander CSG
- Nee, de cliënt stopt vanwege (meerdere antwoorden mogelijk)

Medische redenen:

- Nierfunctiestoornis
- Medicatie interacties
- Hiv-diagnose

Persoonlijke redenen:

- Minder risicogedrag
- Ervaren bijwerkingen
- Logistieke redenen
- Financiële redenen
- Niet therapiegetrouw

Anders

- Anders, nl....
- Onbekend

Indien ja: welke testfrequentie is in principe afgesproken met de cliënt?

- 3-maandelijks
- 4-maandelijks
- 5-maandelijks
- 6-maandelijks
- Anders, nl ...

Uitgevoerd laboratorium onderzoek en uitslagen

- Chlamydia onderzoek
- Gonorrhoe onderzoek
- Syfilis onderzoek
- Hiv onderzoek
 - Opt out voor hiv
- Hepatitis B onderzoek
- Hepatitis C onderzoek
- Trichomonas onderzoek
- HSV onderzoek
- Geen lab onderzoek
- Overig onderzoek, nl....

Chlamydia onderzoek

- Vaginaal
- Cervicaal
- Urethraal
- Anorectaal
- Oraal
- Urine

Indien chlamydia positief: serovartypering voor LGV gedaan?

- Ja
- Nee

Uitslag typering?

- Positief
- Negatief
- LGV-PCR niet te beoordelen

Hepatitis C onderzoek

- anti-HCV
- HCV-RNA

Condylomata acuminata onderzoek

- Nee
- Ja

MPX (apenpokkenvirus/ Monkeypox) onderzoek

- Nee
- Ja

Gonorrhoe onderzoek

- | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Gram preparaat | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief | |
| <input type="checkbox"/> Kweek vaginaal/cervicaal | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief | <input type="checkbox"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek urethraal | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief | <input type="checkbox"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek anorectaal | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief | <input type="checkbox"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek oraal | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief | <input type="checkbox"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> NAAT cervicaal | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief | |
| <input type="checkbox"/> NAAT urethraal | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief | |
| <input type="checkbox"/> NAAT anorectaal | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief | |
| <input type="checkbox"/> NAAT oraal | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief | |
| <input type="checkbox"/> NAAT urine | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief | |
| <input type="checkbox"/> NAAT vaginaal | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief | |

Indien positieve kweek: gevoeligheidsbepaling gedaan?

- Ja, GRAS
- Nee
- Nvt

Indien gevoeligheidsbepaling gedaan: welke locaties(s)?

- Urethraal
- Cervicaal
- Anaal
- Oraal

Uitslagen GRAS

urethraal:

Cefotaxim MIC:
Ceftriaxon MIC:
Azitromycine MIC:
Ciprofloxacin MIC:
Tetracycline MIC:

Facultatief:

Beta lactamase:
○ Positief
○ Negatief
Spectinomycine MIC:
Penicilline MIC:

cervicaal:

Cefotaxim MIC:
Ceftriaxon MIC:
Azitromycine MIC:
Ciprofloxacin MIC:
Tetracycline MIC:

Facultatief:

Beta lactamase
○ Positief
○ Negatief
Spectinomycine MIC:
Penicilline MIC:

anaal:

Cefotaxim MIC:
Ceftriaxon MIC:
Azitromycine MIC:
Ciprofloxacin MIC:
Tetracycline MIC:

Facultatief:

Beta lactamase
○ Positief
○ Negatief
Spectinomycine MIC:
Penicilline MIC:

oraal

Cefotaxim MIC:
Ceftriaxon MIC:
Azitromycine MIC:
Ciprofloxacin MIC:
Tetracycline MIC:

Facultatief:

Beta lactamase
○ Positief
○ Negatief
Spectinomycine MIC:
Penicilline MIC:

Diagnose

Gonorrhoe

- Negatief
- Urethraal
- Cervicaal
- Vaginaal
- Anorectaal
- Oraal
- Obv gepoolde monsters

Hepatitis B

- Infectieus
- Doorgemaakt
- Negatief

Indien infectieus

(facultatief):

- Acuut
- Chronisch
- Onbekend

Ulceraties

- Herpes gen. primo-inf. type 1
- Herpes gen. primo-inf. type 2
- Herpes gen. primo-inf. type onbekend
- Herpes genitalis recidief
- Ulcus molle
- LGV anorectaal
- LGV urogenitaal
- LGV oraal
- LGV ulcus

Chlamydia

- Negatief
- Urethraal
- Cervicaal
- Vaginaal
- Anorectaal
- Oraal
- Obv gepoolde monsters

Condylomata acuminata

- Ja, nieuw
- Ja, reeds eerder geconstateerd
- Nee

Overige soa diagnoses

- Urethritis
- Mycoplasma genitalium
- Trichomoniasis
- Schaamluis
- Scabiës

Syfilis

- Negatief
- Lues I
- Lues II
- Lues latens recens
- Lues latens tarda
- Lues, (eerder) behandeld
- Lues, stadium onbekend

MPX (apenpokkenvirus/ Monkeypox)

- Negatief
- Positief

Hiv

- Positief
- Negatief

Indien positief, infectie duur:

- Onbepaalde duur
- Recente infectie
- Bekend hiv positief

Andere (huid)aandoeningen

- Candidiasis / balanitis
- Bacteriële vaginose / gardnerella
- Proctitis
- Epididymitis
- Ulcus e.c.i.
- Mollusca contagiosa
- PID
- Anders, nl....

Hepatitis C

- Negatief
antistof negatief, of antistof en RNA negatief, of RNA negatief zonder antistof test
- Infectieus
RNA positief
- Doorgemaakt of behandeld
antistof positief en RNA negatief
- Infectieus/niet infectieus onbekend
antistof positief en geen RNA test verricht

Is de cliënt bekend met een eerdere Hepatitis C infectie?

- Ja
- Nee
- Onbekend

Indien infectieus:

- Nieuw/herinfectie
- Bekend

Indien niet negatief: gaat het om een recente seroconversie of switch naar positieve RNA (<12 maanden)?

- Ja
- Nee
- Onbekend